

СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
 (для выписывания в рецептах на итоговых занятиях и на экзамене)
для студентов лечебного факультета

№ п/п	Название	Формы выпуска	Показание к применению (пример)	Способ применения (пример)	Высшие дозы для взрослых
1.	Прокайн (Procainum) Новокаин (Novocaine)	порошок	местная анестезия	в составе магистральных прописей, в т.ч. р-ров для внутреннего применения	ВРД внутрь – 0,75
		флаконы р-р 0,25%; 0,5% – 100; 200; 400 мл; амп. р-р 0,25%; 0,5% – 1; 2; 5; 10; 20 мл		инфилтрационная анестезия	ВРД – 0,1
		р-р 1%; 2% – 1; 2; 5; 10 мл		проводниковая и перидуральная анестезия	
2.	Цинка сульфат (Zinci sulfas)	порошок	стимуляция рвоты при остром пищевом или медикамен- тозном отравлении	внутрь 0,1-0,3 однократно	ВРД – 1,0
			антибактери- альная обра- ботка слизис- тых оболочек глаз	в составе р-ров 0,25%; 0,5% наружно	
3.	Неостигмина метилсульфат (Neostigmini methylsulfas) Прозерин (Proserinum)	порошок, таб.0,015	миастения	внутрь по 0,0075-0,015 1-2 раза в сутки	ВРД – 0,015; ВСД – 0,05
		амп. р-р 0,05% – 1 мл		в/в; п/к по 0,5-1 мл	ВРД – 0,002
4.	Атропина сульфат (Atropini sulfas)	порошок	обследование глазного дна	в составе магистральных прописей, в т.ч. р-ра 1% и мази 1% для наружного применения (в глаз)	
		амп. р-р 0,05%; 0,1% – 1 мл	премедика- ция наркоза	в/в; в/м; п/к по 0,25-1 мл	ВРД – 0,001; ВСД – 0,003
			отравление М,Н-холино- миметиками	в/в. Доза определяется тяжестью отравления. Допустимо значительное превышение высших доз	
5.	Платифиллин (Platyphyllinum)	порошок	спазм гладкой мускулатуры внутренних органов (колики)	в составе магистральных прописей	ВРД – 0,01 ВСД – 0,03
		таб.0,005		внутрь по 0,003-0,005 2-3 раза в сутки	
		р-р 0,2% – 1 мл амп.		п/к по 1-2 мл 3 раза в сутки	
6.	Ипратропия бромид	аэрозоль дозированный	бронхиальная астма	ингаляции по 2 вдоха 4 раза в день	ВСД – 0,001

	(Ipratropii bromidum) «Атровент» (``Atrovent``)	0,4% 10 мл (200 доз по 0,00002) р-р 0,025% 20 мл			
				ингаляции через небулайзер по 40 капель 3-4 раза в день с интервалом не менее 2 часов	
7.	Азаметония бромид (Azamethonii bromidum) Пентамин (Pentaminum)	р-р 5% – 1; 2 мл амп.	гипертонический криз	в/м, по 0,5-2 мл в/в медленно под контролем артериального давления до достижения целевого уровня	ВРД – 0,15 ВСД – 0,45
8.	Эpineфрин (Epinephrinum) Адреналин (Adrenaline)	порошок р-р 0,1% – 1 мл амп.	открыто-угольная глаукома анафилактический шок асистолия	в составе магистральных прописей, в т.ч. р-ра 1%; 2% для наружного применения (в глаз) и р-ров местных анестетиков п/к, редко в/м или в/в 0,2-0,75 мл внутрисердечно 1 мл	ВРД – 0,001 ВСД – 0,005
9.	Салбутамол (Salbutamolum)	порошок; таб. 0,002; 0,004 аэрозоль дозированный 0,2% – 10 мл (200 доз по 0,0001); 0,075% – 12 мл (90 доз по 0,0001)	угроза невынашивания беременности бронхиальная астма	внутрь по 0,002-0,004 4 раза в сутки ингаляционно по 1 дозе при приступе удушья, но не чаще 4-х раз в сутки	ВСД – 0,032
10.	Фенилэфрин (Phenylephrinum) Мезатон (Mesaton)	р-р 1% – 1 мл амп.	острая гипотензия (передозировка средств для наркоза)	п/к, в/м по 0,5-1 мл в/в по 0,1-0,5 мл	ВРД – 0,005 ВСД – 0,025
11.	Пропранолол (Propranololum) Анаприлин (Anaprilin) Обзидан (Obsidan)	таб. 0,01;0,04 р-р 0,1% – 5 мл амп.	профилактика приступа стенокардии, артериальная гипертония экстрасистолия	внутрь по 0,04-0,08 2-3 раза в сутки в/в струйно медленно 1-5 мл	ВСД – 0,32 ВСД – 0,24
12.	Бисопролол (Bisoprololum)	таб., покрытые оболочкой, 0,0025; 0,005; 0,01	артериальная гипертония	внутрь по 0,00125-0,01 1 раз в сутки утром	ВСД – 0,01
13.	Празозин (Prazosinum)	таб. 0,0005; 0,001	артериальная гипертония	внутрь по 0,0005 по вечерам, через 3-7 дней – по 0,0005 2-3 раза в день, еще через 3-7 дней – 0,001 2-3 раза в сутки	ВСД – 0,02
14.	Этанол (Ethanol) Спирт этиловый (Spiritus aethylicus)	р-р 40% р-р 70%	согревающий компресс обработка рук хирурга	наружно и для приготовления лекарственных форм	максимальная концентрация в/в - 33%

		р-р 90%; 95%	обработка мед. инстру- ментов		
15.	Диазепам (Diazepamum) Сибазон (Sibazon) Седуксен (Seduxen) Реланиум (Relanium)	порошок; таб.0,005	невроз	внутрь по 0,005-0,015 1-3 раза в сутки	ВСД – 0,12
		р-р 0,5% – 2 мл амп.	купирование судорог	в/в; в/м по 2-4 мл	ВСД – 0,12
16.	Фенитоин (Phenytoinum) Дифенин (Difenine)	порошок; таб.0,117	профи- лактика эпилеп- тического припадка	по 0,117 2-4 раза в сутки	ВСД – 0,6
17.	Фенобарбитал (Phenobarbita- lum)	порошок, таб.0,005; 0,05; 0,1	инсомния	внутрь по 0,1-0,2 за 30-60 минут до сна;	ВРД – 0,2 ВСД – 0,5
			профи- лактика эпилеп- тического припадка	внутрь по 0,05-0,1 2 раза в сутки;	
			гемоли- тическая желтуха новорож- денных	внутрь по 0,005 1 раз в сутки. Таблетки растирают до порошкообразного состояния, добавляют небольшое количество воды и применяют в виде суспензии	
18.	Доксиламин (Doxylaminum) «Донормил» (``Donormyl``)	таб., покрытые оболочкой, 0,015	инсомния	внутрь по 0,0075-0,015 за 15-30 минут до сна	ВРД – 0,03
19.	Леводопа и карбидопа (Levodopum et Carbidopum) «Наком» (``Nakom``)	таб. (содержат 0,25 леводопы и 0,025 карбидопы) N.100	паркин- сонизм	внутрь по 0,5-2 таб. 1-2 раза в сутки	ВСД – 8 таб.
20.	Кодеин*(Codeinum)	порошок	приступы непродуктив- ного кашля	внутрь по 0,015-0,06 4 раза в сутки с интервалом не менее 4 часов	ВРД – 0,1 ВСД – 0,2
21.	Морфин (Morphinum) Морфина гидрохлорид (Morphini hydrochloridum)	порошок	боли, связан- ные со злокаче- ственной опухолью	внутрь по 0,01-0,1 2 раза в сутки	ВРД – 0,02 ВСД – 0,06
		р-р 1% – 1 мл амп.	травмати- ческая боль	п/к по 1 мл с интервалом не менее 3 часов	
22.	Тримеперидин (Trimeperidinum) Промедол (Promedolum)	порошок, таб.0,025,	боли, связан- ные со злокаче- ственной опухолью	внутрь по 0,025-0,05 4-6 раз в сутки	ВРД – 0,05 ВСД – 0,2
		р-р 1%; 2% – 1 мл амп.	почечная колика	п/к, в/м, в/в по 0,01-0,04 с интервалом не менее 4 часов	

23.	Кислота ацетилсалициловая (Acidum acethylsalicylicum)	порошок; таб. 0,25; 0,5	боль, связанная с воспалительным процессом	внутрь после еды по 0,25-1,0 3-6 раз в сутки с интервалом не менее 4 часов	ВРД – 1,0 ВСД – 3,0
	«Аспирин» («Aspirin»)	таб. 0,5			
	«Аспирин» Кардио («Aspirin» Cardio)	таб., покрытые оболочкой, 0,1; 0,3	профилактика тромбоза при ИБС	внутрь по 0,1-0,25 1 раз в сутки после еды	
24.	Парацетамол (Paracetamol)	таб. 0,2; 0,5	лихорадка при вирусном заболевании	внутрь по 0,2–1,0 до 4 раз в сутки	ВСД – 4,0
25.	Ибупрофен (Ibuprofenum) «Нурофен» («Nurofen»)	таб., покрытые оболочкой, 0,2	лихорадка при вирусном заболевании	внутрь по 0,2 3-4 раза в сутки с интервалом не менее 6 часов	ВСД – 1,2
26.	Мелоксикам (Meloxicamum) «Мовалис» («Movalis»)	таб.0,0075; 0,015; суспензия для внутреннего применения 0,15% – 100 мл свечи ректальные 0,0075; 0,015	артрит	внутрь (ректально) по 0,0075-0,015 1 раз в сутки	ВСД – 0,015
		р-р 1% – 1,5 мл амп.		в/м по 0,5-1мл 1 раз в сутки не более 3-х дней	
27.	Хлорпромазин (Chlorpromazine) Аминазин (Aminazine)	драже 0,025; 0,05; 0,1; таблетки, покрытые оболочкой, 0,025; 0,05; 0,1	психоз	внутрь по 0,025-0,075 1-4 раза в сутки	ВСД – 1,0
		р-р 2,5% – 1; 2; 5; 10 мл амп.		в/м, в/в по 1-5 мл 1-3 раза в сутки	
28.	Настойка пустырника (Tinctura Leonuri)	настойка 25 мл	артериальная гипертония I стадии	внутрь по 30-50 капель 3-4 раза в день	
29.	Экстракт валерианы густой (Extractum Valerianaes spissum)	таб., покрытые оболочкой, 0,02	расстройство сна, связанное с перевозбуждением	внутрь по 0,02-0,04 за 30-60 минут до сна	
30.	Амитриптилин (Amitriptylinum)	таб.0,01;0,025;0,05;0,075 драже 0,025 капсулы 0,025; 0,05	депрессия	внутрь 0,025-0,05 на ночь	ВСД – 0,15
		р-р 1% – 2 мл амп.		в/м, в/в по 1-3 мл 3-4 раза в сутки	
31.	Пирацетам (Piracetatum)	порошок; таб., покрытые оболочкой, 0,2;	снижение интеллекта и/или памяти	внутрь по 0,2-0,4 2-4 раза в сутки	ВСД – 4,8

	«Ноотропил» (``Nootropil``)	0,4; 0,8; 1,2; капс.0,2; 0,4	в результате нарушения мозгового кровообра- щения		
		р-р 20% – 5 мл амп.	острое алко- гольное отравление	в/м; в/в по 1,0-2,0 2-4 раза в сутки	ВСД – 12,0
32.	Инсулин растворимый [человеческий генно- инженерный] (Insulinum solubile [humanum biosyntheticum]) «Актрапид» НМ (``Actrapid``) НМ	р-р (1 мл – 100 МЕ) – 10 мл	сахарный диабет	п/к, в/м по 0,1 – 0,3 МЕ/кг за 30 минут до еды 4 раза в сутки	
			диабети- ческая кома	в/в 0,1 МЕ/кг каждые 30 минут	
33.	Глибенкламид (Glibenclamidum) Манинил 1,75 (3,5; 5) (Maninil 1,75 (3,5; 5))	порошок; таб.0,00175; 0,0025; 0,0035; 0,005	сахарный диабет II типа	внутрь по 0,025-0,05 1-3 раза в сутки за 20-30 минут до еды	ВСД – 0,015
34.	Тиамазол (Thiamazolum) Мерказолил (Mercazolil)	таб.0,005	диффузный тиреоток- ический зоб	внутрь после еды по 0,005 3- 4 раза в сутки	
35.	Преднизолон (Prednisolonum)	таб.0,001; 0,005	ревмато- идный артрит	внутрь по 0,001-0,01 2-4 раза в сутки, максимальная доза – утром	ВРД – 0,015 ВСД – 0,1
		сuspension 2,5% – 1 мл амп.		в/м по 1-2 мл 2-4 раза в сутки	ВРД – 0,06
		р-р 1,5% – 2 мл; 3% – 1; 2 мл амп.		в/м по 1-2 мл 2-4 раза в сутки	
		мазь 0,5% – 5,0; 10,0; 20,0	анафилакти- ческий шок	в/в по 1-3 мл	ВРД – 0,3
		мазь глазная 0,5% – 5,0	псориаз	на пораженные участки кожи 1-3 раза в день	
			иридоциклит	в нижний конъюнктивальный мешок по 1-2 см 2-3 раза в сутки	
36.	Беклометазон (Beclometasonum)	аэрозоль дозированный 0,1% – 10 мл (200 доз по 0,00005); 0,2% – 10 мл (200 доз по 0,0001; 400 доз по 0,00005); 0,0435% – 23 мл (200 доз по 0,00005)	бронхиальная астма	ингаляционно через рот или через нос по 1-2 дозам при приступе удушья	ВСД 0,002
37.	Кислота никотиновая	порошок, таб.0,05	pellagra	внутрь по 0,05-0,1 1-3 раза в сутки	ВРД – 0,1 ВСД – 0,5

	(Acidum nicotinicum)	р-р 1% – 1 мл амп.	ишемический инсульт	п/к; в/м; в/в по 1 мл 1-2 раза в сутки	ВРД – 0,1 ВСД – 0,3
38.	Эргокальциферол (Ergocalciferolum)	порошок; драже 500 МЕ	гиповитаминоз D2 у беременных	внутрь по 1-2 драже 1 раз в сутки с 30-32 недели беременности до родов	
		р-р масляный 0,0625% (1 мл – 25000 МЕ, 1 капля – 700 МЕ)	профилактика рахита	внутрь по 1-2 капли 1 раз в сутки	ВКД – 800000 МЕ
39.	Аминофиллин (Aminophyllinum) Эуфиллин (Euphyllin)	порошок, таб.0,15,	бронхиальная астма	внутрь по 0,15 1-3 раза в сутки	ВРД – 0,5 ВСД – 1,5
		р-р 24% – 1 мл амп.		в/м глубоко в верхний наружный квадрант ягодицы по 1 мл 1-3 раза в сутки	ВРД – 0,0056/кг массы тела ВСД – 0,013/кг массы тела
		р-р 2,4% – 10 мл амп.		в/в медленно по 10 мл	
40.	Хлоропирамин (Chloropyraminum) «Супрастин» («Suprastin»)	таб.0,025	поллиноз	внутрь по 0,025 3-4 раза в сутки	
		р-р 2% – 1 мл амп.	ангионевротический отек	в/м; в/в по 0,5-1 мл 1-2 раза в сутки	ВРД – 0,02/кг массы тела
41.	Лоратадин (Loratadineum) «Кларитин» («Claritin»)	таб.0,01 сироп 0,1% - 60; 120 мл	поллиноз	внутрь по 0,01 1 раз в сутки	
42.	Метоклопрамид (Metoclopramideum) «Церукал» («Cerucal»)	таб.0,01	тошнота	внутрь за 30 минут до еды по 0,01 3-4 раза в сутки	ВРД – 0,02 ВСД – 0,06
		р-р 0,5% – 2 мл амп.	рвота	в/м; в/в по 2 мл 3-4 раза в сутки	
43.	Омепразол (Omeprazolum)	капс.0,01; 0,02; 0,04	язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки	внутрь по 0,01-0,04 1 раз в сутки	
44.	Фамотидин (Famotidinum)	порошок, таб., покрытые оболочкой, 0,02; 0,04	язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки	внутрь по 0,02 2 раза в сутки или по 0,04 1 раз в сутки	
45.	Настой из листьев сennы (Infusum foliorum Sennae)	настой 1:10 – 1:20	запор	внутрь по 1/2 стакана вечером после еды. Перед употреблением взболтать	
	Магния сульфат (Magnesii sulfas)	порошок	очищение кишечника перед диагностическими процедурами	в составе магистральных прописей, в т.ч. р-ров для внутреннего применения	ВРД – 30,0 ВСД – 40,0
		р-р 20%; 25% – 5; 10мл амп.	гипертонический криз	в/м, в/в медленно по 5-20 мл	
46.	Бромгексин (Bromhexinum)	таблетки 0,004; 0,008	бронхит	внутрь по 0,004-0,008 3-4 раза в сутки	

		сироп 0,08%; 0,16% – 50;100 мл			
47.	Строфантин-К (Strophanthinum K)	p-р 0,025% – 1 мл амп.	острая сер- дечная недо- статочность	в/в медленно (в течение 5-6 минут) по 0,3-0,5 мл в 20 мл 5%-ного раствора глюкозы	ВРД – 0,0005 ВСД – 0,001
48.	Дигоксин (Digoxinum)	порошок; таб.0,00025;	хроническая сердечная недоста- точность	внутрь; в/в медленно по 0,000125-0,0005 1 раз в сутки под клиническим контролем до достижения насыщения с	ВСД – 0,0015
		p-р 0,025% – 1 мл амп.	острая сер- дечная недо- статочность	последующим расчетом поддерживающей дозы	
49.	Лидокаин (Lidocainum)	порошок	местная анестезия	в составе магистральных прописей	
		аэрозоль дозиро- ванный 10% – 50 мл (650 доз)		на кожу и слизистые оболочки (терминальная анестезия)	
		p-р 1% – 10; 20 мл амп. p-р 2% – 2; 10 мл амп.		для всех видов местной анестезии	
		p-р 10% – 2 мл амп.	желудоч- ковая аритмия	в/м; в/в капельно после разведения до 100-400 мл	ВРД – 0,4 ВСД – 2,0
50.	Верапамил (Verapamilum)	таб., покрытые оболочкой, 0,04; 0,08; драже 0,04; 0,08	предсердная тахиаритмия	внутрь по 0,04-0,08 3-4 раза в сутки	ВРД – 0,16 ВСД – 0,48
		p-р 0,25% – 2 мл амп.		в/в медленно (не быстрее 1 мл/мин) под контролем ЭКГ по 2-4 мл	
51.	Амлодипин (Amlodipinum)	таб.0,0025; 0,005; 0,01	артериальная гипертония	внутрь по 0,0025-0,01 1 раз в сутки	
52.	Кофеин (Coffeineum) Кофеин-бензоат натрия (Coffein-natrii benzoatis)	порошок, таб. 0,1	снижение рабо- тоспо- собности при утомле- нии	внутрь по 0,025-0,1 2-3 раза в сутки	ВРД – 0,4 ВСД – 1,0
		p-р 10% и 20% – 1; 2 мл амп.	восстановле- ние дыхания после наркоза	п/к по 1 мл	
53.	Эналаприл (Enalaprilum)	таб.0,005; 0,01; 0,02	артериальная гипертония	внутрь по 0,0025-0,002 1-2 раза в сутки	ВСД – 0,04
54.	Лозартан (Losartanum)	таб.0,0125; 0,025; 0,05; 0,1	артериальная гипертония	внутрь по 0,0125-0,05 1-2 раза в сутки	
55.	Гидрохлоро- тиазид (Hydrochloro- thiazidum) Гипотиазид (Hypothiazid)	таб.0,025; 0,1	артериальная гипертония	0,025-0,1 препарата 1 раз в сутки утром или 1 раз в 2 дня	ВСД – 0,2
56.	Фуросемид (Furosemidum)	порошок; таб.0,04	хроническая сердечная	внутрь по 0,02-0,04 1 раз в сутки утром	ВСД – 2,0

	«Лазикс» (<i>«Lasix»</i>)		недоста- точность		
		р-р 1% – 2 мл амп.	гиперто- нический криз	в/м; в/в (не быстрее, чем 0,004 в минуту) по 0,02-0,04 1-2 раза в сутки	ВСД – 1,5
57.	Спиронолактон (Spironolacto- num) Верошпирон (Verospiron)	таб.0,025; капс.0,05; 0,1	артериальная гипертония	внутрь по 0,05-0,1 1 раз в сутки	ВСД – 0,4
58.	Нитроглицерин (Nitroglycerinum)	таб.0,0005; р-р масляный 1% – 0,05 мл капс.	купирование приступа стенокардии	под язык по 0,0005 при боли в сердце	ВРД – 0,001
		аэрозоль дозиро- ванный 0,8% – 10 мл (200 доз по 0,0004)		под язык по 1-2 дозы при боли в сердце	
		р-р 0,1% – 2; 5; 10 мл амп.; 50; 100; 500 мл флаконы	кардиоген- ный отёк лёгких	в/в через автоматический дозатор 24-240 мл/сутки	
59.	Изосорбида динитрат (Isosorbidi dinitras) Нитросорбид (Nitrosorbide)	порошок; таб.0,01; 0,02	профи- лактика приступа стенокардии	внутрь до еды по 0,005-0,04 1-4 раза в сутки	ВСД – 0,12
60.	Клопидогрел (Clopidogrelum) «Зилт» (<i>«Zyllt»</i>)	таб., покрытые оболочкой, 0,075	профилакти- ка тромбо- образования при остром инфаркте миокарда	внутрь по 0,075 1 раз в сутки	
61.	Гепарин натрия (Heparinum natrium) Гепарин (Heparin)	раствор 5000 МЕ/мл – 1; 2; 5 мл амп.; 1; 5; 10 мл флаконы	профилакти- ка тромбо- образования при остром инфаркте миокарда	в/в по 5000-10000 МЕ каждые 4-6 часов; п/к в белую линию живота по 8000-10000 МЕ каждые 8 часов	
		мазь 1000 ЕД/г – 15,0; 20,0; 30,0; 50,0; 100,0	поверхност- ный тромбо- флебит	на кожу над пораженной областью 2-3 раза в сутки	
62.	Ривароксабан (Rivaroxabanum) Ксарелто (<i>«Xarelto»</i>)	таб., покрытые оболочкой, 0,0025; 0,01; 0,015; 0,02	предопераци- онная про- филактика тромбоэмбо- лии	внутрь по 0,0025-0,02 1 раз в сутки	ВСД – 0,02
63.	Варфарин (Warfarinum)	таб.0,0025	вторичная профилакти- ка инфаркта миокарда	внутрь по 0,025 1-3 раза в сутки под контролем протромбинового индекса	
64.	Менадион натрия бисульфит (Menadioni natrii)	порошок, таб.0,015,	гипопро- тромбин- емия,	внутрь по 0,015 1-2 раза в сутки	ВРД – 0,03 ВСД – 0,06
		р-р 1% – 1; 2 мл амп.		в/м по 1-1,5 мл 1-2 раза в сутки	ВРД – 0,015 ВСД – 0,03

	bisulfitis) Викасол (Vicasol)		обуслов- ленная дефицитом витамина К		
65.	Кислота фолиевая (Acidum folicum)	порошок, таб.0,001; 0,005	макроцитар- ная гипер- хромная анемия	внутрь по 0,001 1 раз в сутки	ВСД – 0,005
66.	Железа сульфат и кислота аскорбиновая (Ferri sulfas et Acidum ascorbinicum) «Сорбифер Дурулес» («Sorbifer Durules»)	таб., покрытые оболочкой, (содержат железа сульфат 0,1 и аскорбиновую кислоту 0,06) №30; №50	железо- дефицитная анемия	внутрь по 1 таб. 1-2 раза в сутки не разжевывая	
67.	Хлоргексидин (Chlorhexidinum)	p-p 0,05%; 0,2% p-p 0,5%; 1% аэрозоль 0,5% – 70; 100 мл p-p 5%	антибактери- альная обра- ботка слизис- тых оболочек ротовой полости обработка раневой поверхности свечи	полоскать рот 2 раза в сутки на пораженные участки кожи 2 раза в сутки в составе магистральных прописей по 1 свече во влагалище не позднее 2ч после полового акта	
68.	Сульфацетамид (Sulfacetamidum) Сульфацил– натрий (Sulfaculum- natrium) Альбуцид	порошок p-p 10%; 20%; 30% – 5; 10 мл	пневмония бактери- альный конъюнк- тивит	в составе магистральных прописей, в т.ч. р-ра для инъекций 30% в пораженный глаз по 1-2 капли 3-5 раз в сутки	
69.	Метронидазол (Metronidazolum) «Трихопол» (``Trichopol``)	таб. по 0,25; 0,5 свечи вагинальные по 0,5 р-р для инфузий 5% – 100 мл	эрадикация <i>Helicobacter</i> <i>pylori</i> трихомо- надный вагинит внекишечный амебиаз	внутрь по 0,25-0,5 2-3 раза в сутки вагинально по 1 свече 2 раза в сутки внутривенно капельно со скоростью не более 5 мл/мин по 100 мл через каждые 8 часов	ВСД – 4,0
70.	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacinum)	p-p 0,3% – 5; 10 мл	конъюнкти- вит	по 1-2 капли в пораженный глаз каждые 4 часа	ВСД – 1,5

	«Цифран» (``Cifran``)	таб., покрытые оболочкой, 0,25; 0,5; 0,75 р-р 0,2% – 100 мл	пиелонефрит	внутрь по 0,125-0,5 2 раза в сутки в/в капельно по 50-100 мл 2 раза в сутки	
71.	Бензил-пенициллин (Benzyl-penicillinum)	порошок 500000 ЕД; 1000000 ЕД флаconы	гнойный менингит	в/м; в/в по 250000-500000 ЕД 6 раз в сутки; эндolumбально по 5000-10000 ЕД 1 раз в сутки	ВРД – 10000000 ЕД ВСД – 60000000 ЕД
72.	Амоксициллин и клавулановая кислота (Amoxycillinum et Acidum clavulanicum) «Амоксиклав» (``Amoksiklav``)	таб. (содержат 0,25; 0,5 или 0,875 амоксициллина тригидрата и 0,125 калиевой соли клавулановой кислоты) N.10	острый тонзиллит	внутрь не разжёvывая по 0,25-0,5 3 раза в сутки	ВСД клавулановой кислоты – 0,6 ВСД амоксициллина – 6,0
73.	Азитромицин (Azithromycinum) «Сумамед» (``Sumamed``)	порошок; таб., покрытые оболочкой, 0,125; 0,25; 0,5; капс.0,25	средний отит	внутрь, за 1 ч до еды или через 2 ч после еды, по 0,25-1,0 1 раз в сутки	
74.	Гентамицин (Gentamicinum)	0,08 флаconы р-р 4% – 2 мл амп. мазь 0,1% 10,0	острый пиелонефрит инфекционный дерматит	в/м, в/в по 2 мл 2-3 раза в сутки после разведения содержимого флаconа в 2 мл воды для инъекций в/м, в/в по 2 мл 2-3 раза в сутки на пораженные участки кожи 2-3 раза в сутки	ВСД – 0,005/кг массы тела
75.	Рифампицин (Rifampicinum)	порошок; капс.0,15; 0,3 0,15 амп.; 0,15; 0,3; 0,45; 0,6 флаconы	туберкулёз	внутрь, натощак, за 30–60 мин до еды по 0,45-0,6 1 раз в сутки в/в капельно со скоростью 60-80 капель в минуту после полного растворения содержимого амп. или флаconа в воде для инъекций из расчета 0,15/2,5 мл и последующего разведения в 125 мл 5% раствора глюкозы	ВСД – 0,9
76.	Цефотаксим (Cefotaximum) «Клафоран» (``Claforan``)	0,5; 1,0 флаconы	перитонит	в/м; в/в после растворения содержимого флаconа в 2-4 мл воды для инъекций в/м или в 10 мл в/в через каждые 12 часов	ВСД – 4,0
77.	Ацикловир (Acyclovirum) «Зовиракс» (``Zovirax``)	таб.0,2; 0,4; 0,8 мазь 5% – 2,0; 5,0; 10,0; 15,0 мазь 3% – 3,0; 5,0 0,25; 0,5; 1,0 флаconы	герпетическая инфекция	внутрь по 0,2 5 раз в сутки на пораженные участки кожи и слизистых оболочек 4-6 раз в сутки в нижний конъюнктивальный мешок по 1 см 5 раз в сутки в/в капельно после растворения содержимого флаconа в 50-100 мл стерильного 0,9%-ного р-ра	

				хлорида натрия через каждые 8 часов	
78.	Хлорохин (Chloroquinum) Делагил (Delagil)	таб.0,25	малярия	внутрь по 0,25 1 раз в сутки вечером	ВРД – 0,5 ВСД – 1,5
		p-p 5% – 5 мл амп.		в/в медленно по 5-10 мл 2 раза в сутки	
79.	Мебендазол (Mebendazolum) «Вермокс» (``Vermox``)	порошок; таб.0,1	аскаридоз	внутрь по 0,1 2 раза в сутки	
80.	Флуконазол (Fluconazolum)	порошок; капс.0,05; 0,1; 0,15; таблетки, покрытые оболочкой, 0,05; 0,1; 0,15	профилактика грибковых инфекций при лечении цитостатиками	внутрь по 0,05-0,15 1 раз в сутки	
		p-p 0,2% – 50; 100мл флаконы	криптококкоз	в/в капельно со скоростью 2 мл/минуту по 50-100 мл 1 раз в сутки	

Список сокращений: р-р - раствор; амп. – ампулы; таб. – таблетки; капс. – капсулы; в/м – внутримышечно; в/в – внутривенно; п/к – подкожно.

ВРД – высшая разовая доза / максимальная рекомендуемая разовая доза; ВСД – высшая суточная доза / максимальная рекомендуемая суточная доза; ВКД – высшая курсовая доза / максимальная рекомендуемая курсовая доза.

* Кодеин обычно назначается в составе комбинированных препаратов «Терпинкод Н» («Terpincodum N») – кодеин + терпингидрат, «Седал-М» («Sedal-M») – кодеин + кофеин + метамизол натрия + парацетамол + фенобарбитал и др.

Международное непатентованное название выделено **полужирным шрифтом**. В кавычках « » указаны коммерческие названия, защищенные патентами.