

**СПИСОК ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ**  
(для выписывания в рецептах на итоговых занятиях и на экзамене)  
**для студентов педиатрического факультета**

№ п/п	Название	Формы выпуска	Показание к применению (пример)	Способ применения (пример)	Высшие дозы для взрослых	
1.	<b>Прокаин (Procainum)</b> Новокаин (Novocaine)	порошок	местная анестезия	в составе магистральных прописей, в т.ч. р-ров для внутреннего применения	ВРД внутрь – 0,75	
		флаконы р-р 0,25%; 0,5% – 100; 200; 400 мл; амп. р-р 0,25%; 0,5% – 1; 2; 5; 10; 20 мл		инфильтрационная анестезия		ВРД – 0,1
		р-р 1%; 2% – 1; 2; 5; 10 мл		проводниковая и перидуральная анестезия		
2.	<b>Цинка сульфат (Zinci sulfas)</b>	порошок	стимуляция рвоты при остром пищевом или медикаментозном отравлении	внутри 0,1-0,3 однократно	ВРД – 1,0	
			антибактериальная обработка слизистых оболочек глаз	в составе р-ров 0,25%; 0,5% наружно		
3.	<b>Неостигмина метилсульфат (Neostigmini methylsulfas)</b> Прозерин (Proserinum)	порошок, таб.0,015	миастения	внутри по 0,0075-0,015 1-2 раза в сутки	ВРД – 0,015; ВСД – 0,05	
		амп. р-р 0,05% – 1 мл		в/в; п/к по 0,5-1 мл		ВРД – 0,002
4.	<b>Атропина сульфат (Atropini sulfas)</b>	порошок	обследование глазного дна	в составе магистральных прописей, в т.ч. р-ра 1% и мази 1% для наружного применения (в глаз)	ВРД – 0,001; ВСД – 0,003	
		амп. р-р 0,05%; 0,1% – 1 мл	премедикация наркоза	в/в; в/м; п/к по 0,25-1 мл		
			отравление М,Н-холинимиетиками	в/в. Доза определяется тяжестью отравления. Допустимо значительное превышение высших доз		
5.	<b>Платифиллин (Platyphyllinum)</b>	порошок	спазм гладкой мускулатуры внутренних органов (колики)	в составе магистральных прописей	ВРД – 0,01 ВСД – 0,03	
		таб.0,005	внутри по 0,003-0,005 2-3 раза в сутки			
		р-р 0,2% – 1 мл амп.		п/к по 1-2 мл 3 раза в сутки		
6.	<b>Ипратропия бромид</b>	аэрозоль дозированный	бронхиальная астма	ингаляции по 2 вдоха 4 раза в день	ВСД – 0,001	

	<b>(Ipratropii bromidum)</b> «Атровент» («Atrovent»)	0,4% 10 мл (200 доз по 0,00002)			
		р-р 0,025% 20 мл		ингаляции через небулайзер по 40 капель 3-4 раза в день с интервалом не менее 2 часов	
7.	<b>Азаметония бромид (Azamethonii bromidum)</b> Пентамин (Pentaminum)	р-р 5% – 1; 2 мл амп.	гипертонический криз	в/м, по 0,5-2 мл в/в медленно под контролем артериального давления до достижения целевого уровня	ВРД – 0,15 ВСД – 0,45
8.	<b>Эпинефрин (Epinephrinum)</b> Адреналин (Adrenaline)	порошок	открытоугольная глаукома	в составе магистральных прописей, в т.ч. р-ра 1%; 2% для наружного применения (в глаз) и р-ров местных анестетиков	
		р-р 0,1% – 1 мл амп.	анафилактический шок асистолия	п/к, редко в/м или в/в 0,2-0,75 мл внутрисердечно 1 мл	ВРД – 0,001 ВСД – 0,005
9.	<b>Салбутамол (Salbutamolum)</b>	порошок; таб. 0,002; 0,004	угроза невынашивания беременности	внутри по 0,002-0,004 4 раза в сутки	ВСД – 0,032
		аэрозоль дозированный 0,2% – 10 мл (200 доз по 0,0001); 0,075% – 12 мл (90 доз по 0,0001)	бронхиальная астма	ингаляционно по 1 дозе при приступе удушья, но не чаще 4-х раз в сутки	
10.	<b>Фенилэфрин (Phenylephrinum)</b> Мезатон (Mesaton)	р-р 1% – 1 мл амп.	острая гипотензия (передозировка средств для наркоза)	п/к, в/м по 0,5-1 мл в/в по 0,1-0,5 мл	ВРД – 0,005 ВСД – 0,025
11.	<b>Пропранолол (Propranololum)</b> Анаприлин (Anaprilin) Обзидан (Obsidan)	таб. 0,01; 0,04	профилактика приступа стенокардии, артериальная гипертония	внутри по 0,04-0,08 2-3 раза в сутки	ВСД – 0,32
		р-р 0,1% – 5 мл амп.	экстрасистолия	в/в струйно медленно 1-5 мл	ВСД – 0,24
12.	<b>Бисопролол (Bisoprololum)</b>	таб., покрытые оболочкой, 0,0025; 0,005; 0,01	артериальная гипертония	внутри по 0,00125-0,01 1 раз в сутки утром	ВСД – 0,01
13.	<b>Празозин (Prazosinum)</b>	таб. 0,0005; 0,001	артериальная гипертония	внутри по 0,0005 по вечерам, через 3-7 дней – по 0,0005 2-3 раза в день, еще через 3-7 дней – 0,001 2-3 раза в сутки	ВСД – 0,02
14.	<b>Этанол (Ethanol)</b> Спирт этиловый (Spiritus aethylicus)	р-р 40%	согревающий компресс	наружно и для приготовления лекарственных форм	максимальная концентрация в/в - 33%
		р-р 70%	обработка рук хирурга		

		р-р 90%; 95%	обработка мед. инструментов		
15.	<b>Диазепам (Diazepam)</b> Сибазон (Sibazon) Седуксен (Seduxen) Реланиум (Relanium)	порошок; таб.0,005 р-р 0,5% – 2 мл амп.	невроз купирование судорог	внутри по 0,005-0,015 1-3 раза в сутки в/в; в/м по 2-4 мл	ВСД – 0,12 ВСД – 0,12
16.	<b>Фенитоин (Phenytoinum)</b> Дифенин (Difenine)	порошок; таб.0,117	профилактика эпилептического припадка	по 0,117 2-4 раза в сутки	ВСД – 0,6
17.	<b>Фенобарбитал (Phenobarbitalum)</b>	порошок, таб.0,005; 0,05; 0,1	инсомния профилактика эпилептического припадка гемолитическая желтуха новорожденных	внутри по 0,1-0,2 за 30-60 минут до сна; внутри по 0,05-0,1 2 раза в сутки; внутри по 0,005 1 раз в сутки. Таблетки растирают до порошкообразного состояния, добавляют небольшое количество воды и применяют в виде суспензии	ВРД – 0,2 ВСД – 0,5
18.	<b>Доксиламин (Doxylaminum)</b> «Донормил» («Donormyl»)	таб., покрытые оболочкой, 0,015	инсомния	внутри по 0,0075-0,015 за 15-30 минут до сна	ВРД – 0,03
19.	<b>Леводопа и карбидопа (Levodopum et Carbidopum)</b> «Наком» («Nakom»)	таб. (содержат 0,25 леводопы и 0,025 карбидопы) N.100	паркинсонизм	внутри по 0,5-2 таб. 1-2 раза в сутки	ВСД – 8 таб.
20.	<b>Кодеин* (Codeinum)</b>	порошок	приступы непродуктивного кашля	внутри по 0,015-0,06 4 раза в сутки с интервалом не менее 4 часов	ВРД – 0,1 ВСД – 0,2
21.	<b>Морфин (Morphinum)</b> Морфина гидрохлорид (Morphini hydrochloridum)	порошок р-р 1% – 1 мл амп.	боли, связанные со злокачественной опухолью травматическая боль	внутри по 0,01-0,1 2 раза в сутки п/к по 1 мл с интервалом не менее 3 часов	ВРД – 0,02 ВСД – 0,06 ВРД – 0,02 ВСД – 0,06
22.	<b>Тримеперидин (Trimeperidinum)</b> Промедол (Promedolum)	порошок, таб.0,025, р-р 1%; 2% – 1 мл амп.	боли, связанные со злокачественной опухолью почечная колика	внутри по 0,025-0,05 4-6 раз в сутки п/к, в/м, в/в по 0,01-0,04 с интервалом не менее 4 часов	ВРД – 0,05 ВСД – 0,2 ВРД – 0,04 ВСД – 0,16

23.	<b>Кислота ацетилсалициловая (Acidum acetylsalicylicum)</b>	порошок; таб. 0,25; 0,5	боль, связанная с воспалительным процессом	внутри после еды по 0,25-1,0 3-6 раз в сутки с интервалом не менее 4 часов	ВРД – 1,0 ВСД – 3,0			
	«Аспирин» («Aspirin»)	таб. 0,5						
24.	<b>Парацетамол (Paracetamol)</b>	таб. 0,2; 0,5	лихорадка при вирусном заболевании	внутри по 0,2–1,0 до 4 раз в сутки	ВСД – 4,0 (0,06 на 1 кг массы тела)			
		суспензия для внутреннего применения 2,4% - 100; 150; 200 мл				внутри по 5-10 мл (1-2 мерных ложки) до 4 раз в сутки с интервалом не менее 4 часов		
		свечи ректальные 0,05; 0,1; 0,125; 0,5; 0,5				ректально по 0,05-0,5 до 4 раз в сутки с интервалом не менее 4 часов и не более 3 суток		
25.	<b>Ибупрофен (Ibuprofenum)</b> «Нурофен» («Nurofen»)	таб., покрытые оболочкой, 0,2	лихорадка при вирусном заболевании	внутри по 0,2 3-4 раза в сутки с интервалом не менее 6 часов	ВСД – 1,2			
		«Нурофен» для детей («Nurofen» for Children)				суспензия для внутреннего применения 2% - 100; 150; 200 мл	внутри после встряхивания флакона по 1-2 дозировочным шприцам (5мл) не чаще 3-х раз в сутки	ВСД – 0,03 на 1 кг массы тела
						свечи ректальные 0,06	ректально по 0,06 не чаще 3-4 раз в сутки	
26.	<b>Мелоксикам (Meloxicamum)</b> «Мовалис» («Movalis»)	таб. 0,0075; 0,015; суспензия для внутреннего применения 0,15% – 100 мл свечи ректальные 0,0075; 0,015	артрит	внутри (ректально) по 0,0075-0,015 1 раз в сутки	ВСД – 0,015			
		р-р 1% – 1,5 мл амп.				в/м по 0,5-1мл 1 раз в сутки не более 3-х дней	ВСД – 0,015	
27.	<b>Хлорпромазин (Chlorpromazinum)</b> Аминазин (Aminazine)	драже 0,025; 0,05; 0,1; таблетки, покрытые оболочкой, 0,025; 0,05; 0,1	психоз	внутри по 0,025-0,075 1-4 раза в сутки	ВСД – 1,0			
		р-р 2,5% – 1; 2; 5; 10 мл амп.				в/м, в/в по 1-5 мл 1-3 раза в сутки	ВРД в/в – 0,1; в/м – 0,15 ВСД в/в – 0,25; в/м – 0,6	
28.	<b>Настойка пустырника (Tinctura Leonuri)</b>	настойка 25 мл	артериальная гипертония I стадии	внутри по 30-50 капель 3-4 раза в день				
29.	<b>Экстракт валерианы густой (Extractum Valerianae spissum)</b>	таб., покрытые оболочкой, 0,02	расстройство сна, связанное с перевозбуждением	внутри по 0,02-0,04 за 30-60 минут до сна				

30.	<b>Амитриптилин (Amitriptylinum)</b>	таб.0,01;0,025;0,05;0,075 драже 0,025 капсулы 0,025; 0,05	депрессия	внутри 0,025-0,05 на ночь	ВСД – 0,15
		р-р 1% – 2 мл амп.		в/м, в/в по 1-3 мл 3-4 раза в сутки	
31.	<b>Пирацетам (Piracetamum)</b> «Ноотропил» («Nootropil»)	порошок; таб., покрытые оболочкой, 0,2; 0,4; 0,8; 1,2; капс.0,2; 0,4	снижение интеллекта и/или памяти в результате нарушения мозгового кровообращения	внутри по 0,2-0,4 2-4 раза в сутки	ВСД – 4,8
		р-р 20% – 5 мл амп.		острое алкогольное отравление	
32.	<b>Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный] (Insulinum solubile [humanum biosyntheticum])</b> «Актрапид» НМ («Actrapid» НМ)	р-р (1 мл – 100 МЕ) – 10 мл	сахарный диабет	п/к, в/м по 0,1 – 0,3 МЕ/кг за 30 минут до еды 4 раза в сутки	
			диабетическая кома	в/в 0,1 МЕ/кг каждые 30 минут	
33.	<b>Глибенкламид (Glibenclamidum)</b> <b>Манинил 1,75 (3,5; 5) (Maninil 1,75 (3,5; 5))</b>	порошок; таб.0,00175; 0,0025; 0,0035; 0,005	сахарный диабет II типа	внутри по 0,025-0,05 1-3 раза в сутки за 20-30 минут до еды	ВСД – 0,015
34.	<b>Тиамазол (Thiamazolium)</b> Мерказолил (Mercazolil)	таб.0,005	диффузный тиреотоксический зоб	внутри после еды по 0,005 3-4 раза в сутки	
35.	<b>Преднизолон (Prednisolonum)</b>	таб.0,001; 0,005	ревматоидный артрит	внутри по 0,001-0,01 2-4 раза в сутки, максимальная доза – утром	ВРД – 0,015 ВСД – 0,1
		суспензия 2,5% – 1 мл амп.		в/м по 1-2 мл 2-4 раза в сутки	
		р-р 1,5% – 2 мл; 3% – 1; 2 мл амп.		анафилактический шок	в/м по 1-2 мл 2-4 раза в сутки
		мазь 0,5% – 5,0; 10,0; 20,0	псориаз	на пораженные участки кожи 1-3 раза в день	
		мазь глазная 0,5% – 5,0	иридоциклит	в нижний конъюнктивальный мешок по 1-2 см 2-3 раза в сутки	
36.	<b>Беклометазон (Beclometasonum)</b>	аэрозоль дозированный 0,1% – 10 мл (200)	бронхиальная астма	ингаляционно через рот или через нос по 1-2 дозам при приступе удушья	ВСД 0,002

		доз по 0,00005); 0,2% – 10 мл (200 доз по 0,0001; 400 доз по 0,00005); 0,0435% – 23 мл (200 доз по 0,00005)			
37.	<b>Кислота никотиновая (Acidum nicoticum)</b>	порошок, таб.0,05	пеллагра	внутри по 0,05-0,1 1-3 раза в сутки	ВРД – 0,1 ВСД – 0,5
		р-р 1% – 1 мл амп.	ишемический инсульт	п/к; в/м; в/в по 1 мл 1-2 раза в сутки	ВРД – 0,1 ВСД – 0,3
38.	<b>Эргокальци- ферол (Ergocalci- ferolum)</b>	порошок; драже 500 МЕ	гиповита- миноз D2 у беременных	внутри по 1-2 драже 1 раз в сутки с 30-32 недели беременности до родов	
		р-р масляный 0,0625% (1 мл – 25000 МЕ, 1 капля – 700 МЕ)	профи- лактика рахита	внутри по 1-2 капли 1 раз в сутки	ВКД – 800000 МЕ
39.	<b>Аминофиллин (Aminophyllinum)</b> Эуфиллин (Euphyllin)	порошок, таб.0,15,	бронхиальная астма	внутри по 0,15 1-3 раза в сутки	ВРД – 0,5 ВСД – 1,5
		р-р 24% – 1 мл амп.		в/м глубоко в верхний наружный квадрант ягодицы по 1 мл 1-3 раза в сутки	ВРД – 0,0056/кг массы тела
		р-р 2,4% – 10 мл амп.		в/в медленно по 10 мл	ВСД – 0,013/кг массы тела
40.	<b>Хлоропирамин (Chloropyrami- num)</b> «Супрастин» («Suprastin»)	таб.0,025	поллиноз	внутри по 0,025 3-4 раза в сутки	
		р-р 2% – 1 мл амп.	ангионевро- тический отек	в/м; в/в по 0,5-1 мл 1-2 раза в сутки	ВРД – 0,02/кг массы тела
41.	<b>Лоратадин (Loratadinum)</b> «Кларитин» («Claritin»)	таб.0,01 сироп 0,1% - 60; 120 мл	поллиноз	внутри по 0,01 1 раз в сутки	
42.	<b>Метоклопрамид (Metocloprami- dum)</b> «Церукал» («Cerucal»)	таб.0,01	тошнота	внутри за 30 минут до еды по 0,01 3-4 раза в сутки	ВРД – 0,02 ВСД – 0,06
		р-р 0,5% – 2 мл амп.	рвота	в/м; в/в по 2 мл 3-4 раза в сутки	
43.	<b>Омепразол (Omeprazolum)</b>	капс.0,01; 0,02; 0,04	язвенная болезнь двенадцати- перстной кишки	внутри по 0,01-0,04 1 раз в сутки	
44.	<b>Фамотидин (Famotidinum)</b>	порошок, таб., покрытые оболочкой, 0,02; 0,04	язвенная болезнь двенадцати- перстной кишки	внутри по 0,02 2 раза в сутки или по 0,04 1 раз в сутки	
45.	Настой из листьев сенны (Infusum foliorum Sennae)	настой 1:10 – 1:20	запор	внутри по 1/2 стакана вечером после еды. Перед употреблением взболтать	

	<b>Магния сульфат (Magnesii sulfas)</b>	порошок	очистение кишечника перед диагностическими процедурами	в составе магистральных прописей, в т.ч. р-ров для внутреннего применения	ВРД – 30,0 ВСД – 40,0
		р-р 20%; 25% – 5; 10мл амп.	гипертонический криз	в/м, в/в медленно по 5-20 мл	
46.	<b>Бромгексин (Bromhexinum)</b>	таблетки 0,004; 0,008 сироп 0,08%; 0,16% – 50;100 мл	бронхит	внутри по 0,004-0,008 3-4 раза в сутки	
47.	<b>Строфантин-К (Strophanthinum К)</b>	р-р 0,025% – 1 мл амп.	острая сердечная недостаточность	в/в медленно (в течение 5-6 минут) по 0,3-0,5 мл в 20 мл 5%-ного раствора глюкозы	ВРД – 0,0005 ВСД – 0,001
48.	<b>Дигоксин (Digoxinum)</b>	порошок; таб.0,00025;	хроническая сердечная недостаточность	внутри; в/в медленно по 0,000125-0,0005 1 раз в сутки под клиническим контролем до достижения насыщения с последующим расчетом поддерживающей дозы	ВСД – 0,0015
		р-р 0,025% – 1 мл амп.	острая сердечная недостаточность		
49.	<b>Лидокаин (Lidocainum)</b>	порошок	местная анестезия	в составе магистральных прописей	
		аэрозоль дозированный 10% – 50 мл (650 доз)		на кожу и слизистые оболочки (терминальная анестезия)	
		р-р 1% – 10; 20 мл амп. р-р 2% – 2; 10 мл амп.		для всех видов местной анестезии	
		р-р 10% – 2 мл амп.	желудочковая аритмия	в/м; в/в капельно после разведения до 100-400 мл	ВРД – 0,4 ВСД – 2,0
50.	<b>Верапамил (Verapamilum)</b>	таб., покрытые оболочкой, 0,04; 0,08; драже 0,04; 0,08	предсердная тахикардия	внутри по 0,04-0,08 3-4 раза в сутки	ВРД – 0,16 ВСД – 0,48
		р-р 0,25% – 2 мл амп.		в/в медленно (не быстрее 1 мл/мин) под контролем ЭКГ по 2-4 мл	
51.	<b>Амлодипин (Amlodipinum)</b>	таб.0,0025; 0,005; 0,01	артериальная гипертония	внутри по 0,0025-0,01 1 раз в сутки	
52.	<b>Кофеин (Coffeinum)</b> Кофеин-бензоат натрия (Coffein-natrii benzoatis)	порошок, таб. 0,1	снижение работоспособности при утомлении	внутри по 0,025-0,1 2-3 раза в сутки	ВРД – 0,4 ВСД – 1,0
		р-р 10% и 20% – 1; 2 мл амп.	восстановление дыхания после наркоза	п/к по 1 мл	
53.	<b>Эналаприл (Enalaprilum)</b>	таб.0,005; 0,01; 0,02	артериальная гипертония	внутри по 0,0025-0,002 1-2 раза в сутки	ВСД – 0,04

54.	<b>Лозартан (Losartanum)</b>	таб.0,0125; 0,025; 0,05; 0,1	артериальная гипертония	внутри по 0,0125-0,05 1-2 раза в сутки	
55.	<b>Гидрохлоротиазид (Hydrochlorothiazidum)</b> Гипотиазид (Hypothiazid)	таб.0,025; 0,1	артериальная гипертония	0,025-0,1 препарата 1 раз в сутки утром или 1 раз в 2 дня	ВСД – 0,2
56.	<b>Фуросемид (Furosemidum)</b> «Лазикс» («Lasix»)	порошок; таб.0,04	хроническая сердечная недостаточность	внутри по 0,02-0,04 1 раз в сутки утром	ВСД – 2,0
		р-р 1% – 2 мл амп.	гипертонический криз	в/м; в/в (не быстрее, чем 0,004 в минуту) по 0,02-0,04 1-2 раза в сутки	ВСД – 1,5
57.	<b>Спиронолактон (Spironolactonum)</b> Верошпирон (Verospiron)	таб.0,025; капс.0,05; 0,1	артериальная гипертония	внутри по 0,05-0,1 1 раз в сутки	ВСД – 0,4
58.	<b>Нитроглицерин (Nitroglycerinum)</b>	таб.0,0005; р-р масляный 1% – 0,05 мл капс.	купирование приступа стенокардии	под язык по 0,0005 при боли в сердце	ВРД – 0,001
		аэрозоль дозированный 0,8% – 10 мл (200 доз по 0,0004)		под язык по 1-2 дозы при боли в сердце	
		р-р 0,1% – 2; 5; 10 мл амп.; 50; 100; 500 мл флаконы	кардиогенный отёк лёгких	в/в через автоматический дозатор 24-240 мл/сутки	
59.	<b>Изосорбида динитрат (Isosorbidi dinitras)</b> Нитросорбид (Nitrosorbide)	порошок; таб.0,01; 0,02	профилактика приступа стенокардии	внутри до еды по 0,005-0,04 1-4 раза в сутки	ВСД – 0,12
60.	<b>Клопидогрел (Clopidogrelum)</b> «Зилт» («Zyllt»)	таб., покрытые оболочкой, 0,075	профилактика тромбоза при остром инфаркте миокарда	внутри по 0,075 1 раз в сутки	
61.	<b>Гепарин натрия (Heparinum natrium)</b> Гепарин (Heparin)	раствор 5000 МЕ/мл – 1; 2; 5 мл амп.; 1; 5; 10 мл флаконы	профилактика тромбоза при остром инфаркте миокарда	в/в по 5000-10000 МЕ каждые 4-6 часов; п/к в белую линию живота по 8000-10000 МЕ каждые 8 часов	
		мазь 1000 ЕД/г – 15,0; 20,0; 30,0; 50,0; 100,0	поверхностный тромбоз флебит	на кожу над пораженной областью 2-3 раза в сутки	
62.	<b>Ривароксабан (Rivaroxabanum)</b>	таб., покрытые оболочкой,	предоперационная профилактика	внутри по 0,0025-0,02 1 раз в сутки	ВСД – 0,02



	Ксарелто («Xarelto»)	0,0025; 0,01; 0,015; 0,02	тромбоэмболии		
63.	<b>Варфарин (Warfarinum)</b>	таб.0,0025	вторичная профилактика инфаркта миокарда	внутри по 0,025 1-3 раза в сутки под контролем протромбинового индекса	
64.	<b>Менадион натрия бисульфит (Menadioni natrii bisulfitis)</b> Викасол (Vicasol)	порошок, таб.0,015,	гипопротромбинемия, обусловленная дефицитом витамина К	внутри по 0,015 1-2 раза в сутки	ВРД – 0,03 ВСД – 0,06
		р-р 1% – 1; 2 мл амп.		в/м по 1-1,5 мл 1-2 раза в сутки	ВРД – 0,015 ВСД – 0,03
65.	<b>Кислота фолиевая (Acidum folicum)</b>	порошок, таб.0,001; 0,005	макроцитарная гиперхромная анемия	внутри по 0,001 1 раз в сутки	ВСД – 0,005
66.	<b>Железа сульфат и кислота аскорбиновая (Ferri sulfas et Acidum ascorbinicum)</b> «Сорбифер Дурулес» («Sorbifer Durules»)	таб., покрытые оболочкой, (содержат железа сульфат 0,1 и аскорбиновую кислоту 0,06) №30; №50	железодефицитная анемия	внутри по 1 таб. 1-2 раза в сутки не разжевывая	
67.	<b>Хлоргексидин (Chlorhexidinum)</b>	р-р 0,05%; 0,2%	антибактериальная обработка слизистых оболочек ротовой полости	полоскать рот 2 раза в сутки	
		р-р 0,5%; 1% аэрозоль 0,5% – 70; 100 мл	обработка раневой поверхности	на пораженные участки кожи 2 раза в сутки	
		р-р 5%		в составе магистральных прописей	
		свечи вагинальные по 0,008; 0,016	профилактика заболеваний, передающихся половым путем	по 1 свече во влагалище не позднее 2ч после полового акта	
68.	<b>Сульфацетамид (Sulfacetamidum)</b> Сульфацилнатрий (Sulfacylum-natrium) Альбуцид	порошок	пневмония	в составе магистральных прописей, в т.ч. р-ра для инъекций 30%	
		р-р 10%; 20%; 30% – 5; 10 мл	бактериальный конъюнктивит	в пораженный глаз по 1-2 капли 3-5 раз в сутки	
69.	<b>Метронидазол (Metronidazolium)</b>	таб. по 0,25; 0,5	эрадикация Helicobacter pylori	внутри по 0,25-0,5 2-3 раза в сутки	ВСД – 4,0

	«Трихопол» («Trichopol»)	свечи вагинальные по 0,5	трихомо- надный вагинит	вагинально по 1 свече 2 раза в сутки	
		р-р для инфузий 5% – 100 мл	внекишечный амебиаз	внутривенно капельно со скоростью не более 5 мл/мин по 100 мл через каждые 8 часов	
70.	<b>Ципрофлоксацин</b> ( <b>Ciprofloxacinum</b> ) «Цифран» («Cifran»)	р-р 0,3% – 5; 10 мл	конъюнкти- вит	по 1-2 капли в пораженный глаз каждые 4 часа	ВСД – 1,5
		таб., покрытые оболочкой, 0,25; 0,5; 0,75	пиелонефрит	внутри по 0,125-0,5 2 раза в сутки	
		р-р 0,2% – 100 мл		в/в капельно по 50-100 мл 2 раза в сутки	
71.	<b>Бензил- пенициллин</b> ( <b>Benzylpenicillinu m</b> )	порошок 500000 ЕД; 1000000 ЕД флаконы	гнойный менингит	в/м; в/в по 250000-500000 ЕД 6 раз в сутки; эндолюмбально по 5000-10000 ЕД 1 раз в сутки	ВРД – 10000000 ЕД ВСД – 60000000 ЕД
72.	<b>Амоксициллин и клавулановая кислота</b> ( <b>Amoxicillinum et Acidum clavulanicum</b> ) «Амоксиклав» («Amoksiklav»)	таб. (содержат 0,25; 0,5 или 0,875 амоксициллина тригидрата и 0,125 калиевой соли клавулановой кислоты) N.10	острый тонзиллит	внутри не разжёвывая по 0,25-0,5 3 раза в сутки	ВСД клавула- новой кислоты – 0,6 ВСД амоксицил- лина – 6,0
		порошок (содержит 2,5 амоксициллина тригидрата и 0,625 калиевой соли клавулановой кислоты)		энергично встряхнуть флакон, добавить воды до 100 мл (до метки) в два приема, каждый раз хорошо встряхивая до полного растворения порошка. Принимать внутрь после встряхивания по 1 мерной ложке (5мл) через каждые 12 часов.	
73.	<b>Азитромицин</b> ( <b>Azithromycinum</b> ) «Сумамед» («Sumamed»)	порошок; таб., покрытые оболочкой, 0,125; 0,25; 0,5; капс.0,25	средний отит	внутри, за 1 ч до еды или через 2 ч после еды, по 0,25-1,0 1 раз в сутки	
74.	<b>Гентамицин</b> ( <b>Gentamicinum</b> )	0,08 флаконы	острый пиелонефрит	в/м, в/в по 2 мл 2-3 раза в сутки после разведения содержимого флакона в 2 мл воды для инъекций	ВСД – 0,005/кг массы тела
		р-р 4% – 2 мл амп. мазь 0,1% 10,0	инфекцион- ный дерматит	в/м, в/в по 2 мл 2-3 раза в сутки на пораженные участки кожи 2-3 раза в сутки	
75.	<b>Рифампицин</b> ( <b>Rifampicinum</b> )	порошок; капс.0,15; 0,3 0,15 амп.; 0,15; 0,3; 0,45; 0,6 флаконы	туберкулёз	внутри, натошак, за 30–60 мин до еды по 0,45-0,6 1 раз в сутки в/в капельно со скоростью 60- 80 капель в минуту после полного растворения содержимого амп. или флакона в воде для инъекций из расчета 0,15/2,5 мл и последующего	ВСД – 0,9

				разведения в 125 мл 5% раствора глюкозы	
76.	<b>Цефотаксим (Cefotaximum)</b> «Клафоран» («Claforan»)	0,5; 1,0 флаконы	перитонит	в/м; в/в после растворения содержимого флакона в 2-4 мл воды для инъекций в/м или в 10 мл в/в через каждые 12 часов	ВСД – 4,0
77.	<b>Ацикловир (Acyclovirum)</b> «Зовиракс» («Zovirax»)	таб.0,2; 0,4; 0,8	герпетическая инфекция	внутри по 0,2 5 раз в сутки	
		мазь 5% – 2,0; 5,0; 10,0; 15,0		на пораженные участки кожи и слизистых оболочек 4-6 раз в сутки	
		мазь 3% – 3,0; 5,0		в нижний конъюнктивальный мешок по 1 см 5 раз в сутки	
		0,25; 0,5; 1,0 флаконы		в/в капельно после растворения содержимого флакона в 50-100 мл стерильного 0,9%-ного р-ра хлорида натрия через каждые 8 часов	
78.	<b>Хлорохин (Chloroquinum)</b> Делагил (Delagil)	таб.0,25	малярия	внутри по 0,25 1 раз в сутки вечером	ВРД – 0,5 ВСД – 1,5
		р-р 5% – 5 мл амп.		в/в медленно по 5-10 мл 2 раза в сутки	
79.	<b>Мебендазол (Mebendazolium)</b> «Вермокс» («Vermox»)	порошок; таб.0,1	аскаридоз	внутри по 0,1 2 раза в сутки	
80.	<b>Флуконазол (Fluconazolium)</b>	порошок; капс.0,05; 0,1; 0,15; таблетки, покрытые оболочкой, 0,05; 0,1; 0,15	профилактика грибковых инфекций при лечении цитостатиками	внутри по 0,05-0,15 1 раз в сутки	
		р-р 0,2% – 50; 100мл флаконы	криптококкоз	в/в капельно со скоростью 2 мл/минуту по 50-100 мл 1 раз в сутки	

Список сокращений: р-р - раствор; амп. – ампулы; таб. – таблетки; капс. – капсулы; в/м – внутримышечно; в/в – внутривенно; п/к – подкожно.

ВРД – высшая разовая доза / максимальная рекомендуемая разовая доза; ВСД – высшая суточная доза / максимальная рекомендуемая суточная доза; ВКД – высшая курсовая доза / максимальная рекомендуемая курсовая доза.

\* Кодеин обычно назначается в составе комбинированных препаратов «Терпинкод Н» («Terpinocodum N») – кодеин + терпингидрат, «Седал-М» («Sedal-M») – кодеин + кофеин + метамизол натрия + парацетамол + фенobarбитал и др.

Международное непатентованное название выделено **полужирным шрифтом**. В кавычках « » указаны коммерческие названия, защищенные патентами.